
DISSERTATIO MEDICA

INAUGURALIS,

DE

ASTHMATE.

DISSERTATIO MEDICA INAUGURALIS,

DE

ASTHMA TE;

QUAM,

ANNUENTE SUMMO NUMINE,

Ex Auctoritate Reverendi Admodum Viri

D. GEORGII BAIRD, SS. T. P.

ACADEMIÆ EDINBURGENÆ PRÆFECTI;

NEC NON

Amplissimi SENATUS ACADEMICI Consensu,

Et Nobilissimæ FACULTATIS MEDICÆ Decreto,

PRO

GRADU DOCTORATUS,

SUMMISQUE IN MEDICINA HONORIBUS AC PRIVILEGIIS

RITE ET LEGITIME CONSEQUENDIS;

ERUDITORUM EXAMINI SUBJICIT

ROBERTUS BESNARD,

HIBERNUS.

A. B. T. C. D.

SOCIET. REG. MED. EDIN. SOC. EXTR. ATQUE PRÆS. ANN.

NEC NON,

SOCIET. REG. PHYS. EDIN. SOC. EXTR.


AD DIEM 12 SEPTEMBERIS, HORA LOCOQUE SOLITIS.

EDINBURGI:

CUM PRIVILEGIO,

APUD ROBERTUM ALLAN,

MDCCC.



Digitized by the Internet Archive
in 2020 with funding from
Wellcome Library

DISSERTATIO MEDICA

INAUGURALIS,

DE

ASTHMATE,

SYMP TOMATA, quæ verum asthma prægre-
diuntur, sunt sequentia. Dies complures paroxys-
mum antecedentes ægrotus languorem, animi de-
pressionem lassitudinemque sentit. Somnus per-
turbatus et appetitus diminutus fit. Die paroxys-
mum præunte sæpe occurrunt ventriculi distensio
insignis, eructatio, flatus, præcordiorum strictura
et calor immodicus. Æger in lecto, nisi moleste,
recumbere non potest. Gelidam potionem appe-
tit, quæ ei multum prodest.

A

Sæpe

Sæpe in hoc statu febrili evacuationes usitatae subito exsiccantur. Aliis temporibus si fonticulus adfit, dolorem affert, sanguineus fluit et inflammatione afficitur. Stupor, lassitudo et somnolentia cum oscitatione frequenti et pandiculatione per noctem paroxysmum præeuntem obveniunt. Urina sæpiissime abundat, palletque. Vox irraucescit, et circa diaphragma sentitur anxietas, ejus facili descensu impedito. Tussis arida et convulsiva cum expectoratione parva vel nulla interdum occurrit.

Ad paroxysmi instantis symptomata nunc progredimur. Hic circiter secundam vel tertiam horam matutinam cum pectoris constrictione incipit. Diaphragma ægerrime descendit. Musculi scapulas attollentes ad respirationis difficilis allevationem strenue agunt. Hinc accidit, eos, qui longum huic morbo subiecti sunt, capita inter humeros depressa gerere.

Expiratio, quamvis tarda, inspiratione liberior est,

est, quæ molestissime procedit. Æger tussendi, loquendi vel nasum emungendi inhabilis est. Eadem tempestate expectoratio omnino abest. Ventriculus flatu distenditur et materiei biliosæ evomitio sæpe accedit. Potio frigida ægroto gratissima est. Frequenter ex cubuli surgit ruitque ad fenestram aërem frigidulum avidè inhalans; vel in toro erectus federe cogitur. In hoc situ muscoli et viscera abdominis descensionem diaphragmatis impedire non possunt. Hoc tempore haustus calidi, vinum vel medicamenta ventriculi distentionem molestam augent. FLOYER, cujus dissertatio de hoc argumento attentionem meret, caloris interni sensum tam acute expertus est, ut asthmatis symptomata omnia huic calori imputaret. Pulsus plerumque parvus atque frequens est. Aliquando extremitates frigescent, et cordis palpitatio cum pulsu intermittenti occurrit. Vultus propter sanguinis transitum per pulmones difficiliorem aliquando lividus fit; sæpius vero pallidus et contractus. Oculi protruduntur et torpor quodammodo obvenit. Nonnulli per quatuor vel quinque ho-

rarum spatium sese in toro erigunt, atque capite procurato dormiunt; nam positio recumbens symptomata aggravat. Dormitorium angustum, præcipue cum igne super focum vel pulvere diffuso incommodi multum ægro affert. Etiam stragularum oppressio fere intolerabilis videtur.

Si malum in pejus ruat, cor mire palpitat, membra frigent; malæ nigrescunt et sudor frigidus circa frontem et jugulum emanat. Oculi protrusi lacrymas involuntarias emittunt. Nares fiunt acutæ, et labia contrahuntur. Musculi detumescunt, flaccescunt, et vires vitæ summopere languent. Soporosi deveniunt ægri, sed parum dormiunt. In animi deliquium non raro cadunt; delirant, et nonnunquam etiam mors finem miseris imponit.

At si vertatur in melius; angustia circa præcordia et pectus sensim minuitur et tandem omnino desinit. Calor per totum corpus æqualiter distribuitur et levi sudore cutis madet. Plerumque co-

pia phlegmatis viscidæ lineis nigris discriminati expuitur. Cessat sputum cum paroxysmo. Urinæ nunc rubræ et turbidæ fiunt, et sedimentum sæpe haud absimile illi quod post paroxysmum febris intermittens apparet, deponunt.

Paroxysmus nunc ferius, nunc citius solvitur. Nonnunquam durat tres vel quatuor dies; nunc intra horam unam vel alteram omnino desinit. Sed observandum est, quod, quamvis malum ad quartam diem vel ultra nonnunquam protrahitur, attamen per totum hoc tempus non eadem vehementia ægrum infestat: remissiones enim, quamvis obscuriores, sæpius observandæ sunt, mane præcipue; et tunc corpore antrorsum vel ad unum vel alterum latus inclinato, sæpe somnus obrepit.

Non tamen semper hoc ordine et eadem vehementia apparent symptomata; diversis enim temporibus, vel in eodem vel in diversis ægris multum discrepant. Nunc ante accessum alvus tumet

et

et ructus copiose emittuntur; nunc cessante paroxysmo, qui interdum absque ullo prægresso signo, uno quasi ictu ægrum invadit, et eodem modo desinit. Nonnunquam absque febre cursum suum absolvit; nunc febris accessionem comitatur. Urinæ nunc pallent et valde copiosæ sunt; nunc rubræ et parvæ. Duratio quoque paroxysmorum in variis casibus multum variat. Per æstivos menses paroxysmi multum graviores sunt quam per hiernos. Calor permultis testantibus universè paroxysmum exasperat protrahitque. Observandum est, ut quanto longior ullius paroxysmi duratio sit, tanto proximi accessus protrahitur. Sanguis, ut in pneumonia, superficiem coriaceam albam ostendit.

Hicce morbus per se raro mortalis; sed alios morbos inducendo aliquando jugulat. Hoc accidit, ubi paroxysmi vehementiores et crebriores invadunt; nam hoc modo functiones pulmonum aliorumque viscerum turbantur et hinc varia mala oriuntur. Phthisis, hydrops particularis vel universalis,

versalis, paralyfis, aneurifmus hujus morbi fe-
quentæ funt. Multi nihilominus per multos an-
nos vixerunt hoc malo laborantes; neque e-
jus operatio illorum vitas breviores reddidiffe ap-
paruit.

Homines proclivitatem in afthma, sæpe una cum
genere, deducunt. Interdum vero ipfe morbus
eos, quorum parentes ab ejus impetu vixerunt om-
nino vacui, invadit. Raro ante pubertatem ulios,
nifi quibus insignis congenita fit, proclivitas cor-
ripit.

Utrumque sexum, sæpius autem virilem afficit.
In hominibus, quibus hæc prædifpofitio heredita-
ria adest, quamvis aliquando afthma non plane ap-
pareat, respiratio difficilis quibusdam caufis exci-
tantibus, viz. fumo, tuffi, pulvere talibusque effi-
citur.

“ Attenta docet experientia,” inquit HOFF-
MANN, “ eos potiffimum homines, qui funt tem-
“ peramenti

“peramenti sanguinei, vasis exilioribus tamen co-
 “piosis instructi, obefiores, plethorici, pectoris an-
 “gustioris; in affectum asthmaticum convulsivum
 “esse proclives.”—CULLEN nihilominus obser-
 vare non potuit, hunc morbum in ullo tempera-
 mento particulari sæpius quam aliis occurrere.
 Etiam addit, plethoricos huic malo crebro subjec-
 tos esse; sed usitatè in talibus casibus ægros post
 morbi repetitiones frequentes tabuisse. Hinc con-
 cludere videtur, ut corporis plenitudo pro asthma-
 tis causa prædisponenti haberi nequeat: nam
 morbus, statu plethorico remoto, permanet, et etiam
 gravior fit.

Nunc memorandæ sunt causæ excitantes, quæ
 forsitan sub historia morbi comprehendendi possunt.
 Attamen methodi gratiâ hanc partem sub capite
 novo ordinamus.

CAUSÆ

CAUSÆ EXCITANTES.

Hujus generis causarum nulla plus valet quam
sorbitaneæ caloris et frigoris vicissitudines; præ-
sertim si a frigidiorē ad calidiorē plagam transi-
tio sit. Exinde fit ut hic morbus crebrius vere et
autumno accidat quam cæteris anni tempestatibus.
Hic vero, ut alibi, vetustatis ex consuetudinis vis
nonnihil dominari videtur. Astmaticorum enim
quidam, qui vitam in montosis locis degere soliti
sunt, in planis et pædosis spiritum difficilius tra-
hunt: dum e contrario, qui plana et humida loca
diu incoluerunt, si in montosis pejus sese habent.
Quibusdam rus melius convenit, aliis urbs. Illi,
velut FLOYER, in asthma æstiva tempestate sunt
procliviores; illi per frigora hiemis.

Quodcunque inusitatum ad pulmones sanguinis
fluxum efficit hunc morbum excitare potest. Sic

operantur exercitatio immodica, declivitatum ascensus, cursus celeres et alia similia.

Quicquid bronchias irritat, multum quoque nocet. In hac ordine habendi sunt mineralium vapores, præcipuæ sulphuris et aëris hydrogenæ ex carbonum fossilium quibusdam speciebus orientis. Propter hanc causam fabri ferrarii asthmate frequenter afficiuntur. Pari ratione perniciosi sunt vapores arsenici.

Alimenta concoctu difficilia præterea asthma excitare possunt. Nimirum intemperantia in cibo vel potu præsertim priori quoque morbum inducit. Ventriculi inflatio fere semper accessionem accelerat. Ante paroxysmum plerumque vires concoctionis multum imminui videntur; adeo ut æger paroxysmi propinquitatem prospicere possit: Homines ignavi, quorum obesitas respirationem impedit, etiam proverbio asthmatici sunt.

Variæ sunt causæ quarum operatio per totum
corpus

corpus hoc malum expergat; ut inanitio, animi motus turbulenti, terror, sollicitudo, maror; specialiter ubi asthmatis hystericeque conjunctio accidit. — (Vide FLOYER.)

CAUSA PROXIMA,

QUÆ sit hujus mali causa proxima, varii medici variè opinantur. Plerique tamen concordant naturâ spasmodica esse et solum de sede spasmodicæ hujus contractionis inter se differunt. Quibusdam musculi laryngis videntur esse partes solè affectæ; aliis bronchiæ; et aliis musculi omnes respirationi inservientes. Prima opinio simplicitate cæteras certe excellit et forsitan omnia symptomata explicare per se sufficeret. Sibilus strepens, in paroxysmo occurrens vix explicari potest sine quadam laryngis affectione. Quæcunque ea sit, vel spasmodica, vel inflammationis species, vel secretio inusitata, pronunciare difficile est. Ægri, observandum est, nihil aliud in gutture percipiunt nisi sen-

fationem ingrati, quæ raucedinem in quovis morbo comitatur. Huic opinioni favet asthmatis in animalibus productio per compressionem vel irritationem laryngis. Mihi tamen videtur probabile, omnes vel præcipuos musculos respirationis affectos esse: nam respiratio per asthmatis paroxysmum gravem tam impedita evadit, ut hæc suppositio magis quam symptomata explicare vix facere possit. Præterea causæ excitantes usitatae, non ad unam sed omnes partes supradictas æqualiter diriguntur.

PROGNOSIS

In hoc morbo ex sequentibus conditionibus petenda est.

Imo,—Ætate et temperie ægri. Quo junior est æger, eo, cæteris paribus, major spes est sanationis; in juvenili enim ætate systema nervosum valde mobile est, et exinde ex levi quavis causa in
spas-

ipalmodicas affectiones magis proclive redditur, quæ crescente rigiditate, aut aptis remediis plerumque evanescent. Quoad temperiem observari meretur, quod si ex labe hæreditaria malum emanet, mitigari tantum, nunquam vero omnino extirpari potest.

2do,—Si ab arthritide, exanthematibus, evacuationibus solitis, &c. suppressis malum ortum duxerit, spes sola est, hisce reductis, sanitatem iterum restitui posse.

3tio,—Duratione morbi, vehementia et crebri-
tate accessionum. Vetus proverbium est, et ex temporibus immortalis HIPPOCRATIS ad hæc usque diem confirmatum, recentes morbos medicinæ potius concedere, quam antiquos. In asthma hoc nimis sæpe ultra dubium ponitur; quamvis enim per plurimos annos nonnunquam sine multo incommodo duret; et medicamentis rite institutis, levamen sæpe magnum afferatur; vix unquam tamen omnino evincitur. Si autem paroxysmi vhe-

mentiores et crebriores aggrediantur, vel ex seipsis jugulare possunt, vel alios morbos inducendo. In genere observandum est, quod, si ægri palpitationibus, syncope frequenti, febre lenta, nocturno præcipue tempore invadenti, lethargo, paralyfi vel apoplexia tententur, mors plerumque cito succedit.

Quoad hujus morbi diagnosin vel eam ab aliis modum distinguendi, nulla methodus potest melior esse quam mali definitionem a CULLENO prolatam in prospectu habere. Hæc in sequentibus verbis comprehenditur :—

“ Spirandi difficultas per intervalla subiens cum
 “ angustia in pectore sensu et respiratione cum
 “ sibilo strepente ; tussis sub initio paroxysmi dif-
 “ ficilis vel nulla, versus finem libera cum sputo
 “ mucii sæpe copioso.”

Talis symptomatum congressus, nunquam (ni fallor) nisi in asthmate invenitur.

MORBI CURATIO.

Sue curationis capite consilia duo observanda sunt:—*1^{mo}*, Instantis paroxyfimi tractatio; *2^{do}*, Ejus reditui obsistere.

In paroxyfimi tractatione judicare debemus, cuique ex tribus hujusce morbi statibus precipuis æger subjiciatur. Hi sunt sequentes:—Ubi asthma in diathesi plethorica oriatur, ut in juvenibus robustis, aliquandoque puellis mensium suppressione laborantibus; ubi catarrhus asthma superveniat, ut in asthma humorali; et postremo ubi morbus fit asthma spasmodicum purum.

In prima morbi conditione sanguinis missio promptissimum respirationi levamen affert, atque etiam spasmodicæ actionis solutionem efficere potest. Hocce remedium magis necessarium evadit,
ubi

ubi versus caput sanguinis determinatio acciderit. Purgativa mitiora vel enemata ad alvi solutionem modicam administranda sunt. Præcavenda sunt acriora, quæ in asthmaticis paroxysmum excitare per se sufficiunt. Etiam in statu purè spasmodico, si ægri vires maneant, atque paroxysmus inordinate vehemens aggrediatur, venæsectio inter prima antispasmodicorum habenda est, tutòque eam tales ægroti patiuntur. Attamen observandum est, circumspèctionem in usu hujusce remedii hìc magis quam illic necessariam esse. Profectò sine dubio perniciosum est, quodocunque ægrotus morbi duratione emaciatus debilitatusque sit. Præterea quum asthma humorale quodammodo adsit, venæsectio evitanda est. Inter omnes constat, ut, post serosæ effusiones in thorace acciderunt, ubi anasarca et diathesis lencophlegmatica minitari videantur, venæsectio terminationem lethalem acceleret.

Emetica per paroxysmos administranda a nonnullis medicis periculosa æstimantur; et certè ubi capiti determinatio sit vel habitus corporis plethorica,

hoc

hoc negari nequit. Sed his absentibus, et præcipue paulo ante paroxysmorum accessus emetici exhibitio utilis fuit, etiamque penitus paroxysmum repulit.

Emetica, verum est, aliquando distensionem ventriculi augent et paroxysmum graviolem reddunt; præcipue si potiones aquosæ pro emeticorum auxiliis eodem tempore exhibeantur.

Veruntamen emetica stimulantia, quale est sinapi, ventriculum roborant et flatum expellunt. Interdum accidit in asthmate humorali mucum inspissari, indurescere atque fauces oppilare. In talibus casibus ipccacuanha et scilla usque ad nauseæ excitationem datæ mucum attenuaverunt, atque ejus expuitionem faciliorem reddiderunt.

Per paroxysmum enemata utilissima sunt sæcium irritationem removendo. Hæc, quæ asam factidam continent quoque prodesse inveniuntur.

Acida asthmaticis grata sunt.

Regimen antiphlogisticum, alimenti stimulantis evitatio et temperantia in iis, qui asthma longe passi sunt, majorem remediorum partem constituunt.

Opium intestina constipare et cibi concoctionem impedire aptum est, qui hujus medicamenti effectus asthma aggravant. Tamen multi medici celebres, et intra eos CULLEN hoc medicamentum in asthma commendant, dicentes, ejus vires antispasmodicas, sine ullo incommodo ex aliis orienti obtineri posse.

Ubi morbus leniter invasit, præcipue si symptomata catarrhalia coeant, syrups papaverum limonumque mistura multum prodest.

Castoreum quoque feliciter adhibitum fuit. Pulvis recens tincturæ anteferendus est. Gummi assætida late diffusam famam in hoc morbo acquisivit.

vit. Ejus operatio, opii, castorei, moschi additione augetur. Quando debilitas superveniat, usus narcoticorum ambiguus est. Hic saltem opium cum alkali volatili, æthere, similibusve misceri debet.

Mistura composita ex mucilagine, tinctura opii ammoniata et HOFFMANNI liquore anodyno ætate provectis, qui asthmate humoralis afflicti sunt, gratissima inventa fuit.

Liquorem Anglicè denominatum *Punch* vel *Vini Nimum* FLOYER sibi injuriosum expertus est. Quodcumque perspirationem obstruit, asthmatis paroxysmum, præsertim humoralis gignere potest. Semper momenti est sanguinis in pulmonibus accumulationem prævenire et stomachi fibræ vires restituere. Huic consilio subservit frictio quam BÖERHAAVE nimirum in fere omnibus morbis continuis commendavit.

Haud scio an hujus remedii effectus in casibus

leneophlegmaticis nimis parvi pretii æstimantur.

Coffæa laudatur ut antispasmodica in hoc morbo. Sed FLOYER expertus est, ejus usu dyspnœam aggravatam fuisse. CULLEN opinatur injuriosam esse, ut aliæ potiones calidæ. Nihilominus multi suspiriori ab ea levamen insigne derivarunt. Dignissimus DR PERCIVAL in propria persona ejus efficaciam expertus est. Decocta potentissima ad plenum effectum necessaria sunt.

Ubi affectiones catarrhales hunc morbum comitantur; ubi mucus inspissatus, atque præsertim constipatio appareat, mel utile est. Hic pariter oxymel scillæ haud omnino contemnendum est.

Quibusdam aër montium aridus (ut supra memoravimus) aliis aër calidus impurusque magis convenit. Hic ergo experientia sua ægrum dirigere debet. Cibis debet esse mitis, ab omni flatulentia alienus, facilis concoctionis, parca semel quantitate sumendus, sed sæpius repetendus. Vi-

num

num dictum *Claret*, aquæ temperatè commistum, potum saluberrimum suppeditat. Exercitatio lenis, præsertim equitatio vel vectio in rheda, vacuo ventriculo, et diurno tempore adhibita præstantissimos effectus edit. Omnia animi pathemata magna sedulo evitanda sunt; nihil enim paroxysmum certius inducit quam nimia eorum indulgentia, uti ex omnium fere auctorum testimoniis comprobatur.

Summi quoque momenti est ægris, ut tempestivè somno sese darent; hoc enim modo non solum evitant noxas ex nimis vigiliis emanantes, sed corpora ante solitum tempus accessionis fortiora, indeque ad hujus impetum sustinendum (si accesserit) aptiora redduntur.

Semper quoque necesse est, ut alvus soluta teneatur exhibendo pro re nata clysmata et talia remedia quæ non tantum alvi solutionem lenitèr promovent, sed vi simul roborante gaudent.

